



## Anwendung

- im Anschluss an das Stillen
  - in Ergänzung zum Stillen
  - als alleinige Flaschennahrung von Geburt an
  - im Anschluss an jede andere hypoallergene Säuglingsnahrung
- im Anschluss an das Stillen
  - in Ergänzung zum Stillen
  - als alleinige Flaschennahrung von Geburt an
- im Anschluss an das Stillen
  - als alleinige Flaschennahrung von Geburt an
  - im Anschluss an jede andere Säuglingsnahrung
- ab 2. Lebenshalbjahr, nach dem Stillen
  - im Anschluss an jede andere Anfangsnahrung
  - anstelle einer anderen Folgenahrung
- kann ab dem 12. Monat jede andere Folgemilch ersetzen
  - für zwischendurch aus dem Becher
  - als Teil einer Mahlzeit (z. B. zum Brot oder im Müsli)

## Hinweise

Bebivita PRE HA enthält allergenarmes Eiweiß, d. h. es wird in kleine, allergenarme Bausteine aufgespalten und verringert so das Allergierisiko. Nicht bei Kuhmilcheiweißallergie oder bei Verdacht darauf füttern.

Wenn Ihr Baby von Bebivita Pre nicht mehr richtig satt wird, können Sie jederzeit zu Bebivita 1 wechseln.



Auch trinkfertig im 200 ml Tetra-Pak.

Nach dem 6. Monat, wenn Ihr Baby schon Beikost erhält, können Sie auf die sämigere Bebivita 2 Folgemilch umstellen.

Ideal für das Beikostalter

Auch trinkfertig im praktischen 1 L Tetra-Pak.



## Vorteile

**Für einen erholsamen Schlaf**  
**Das Bebivita Abend-Fläschchen**

- ✓ gut sättigend
- ✓ mit wertvollem Getreide
- ✓ ideal vor dem Zubettgehen
- ✓ glutenfrei

- allergenarm
  - enthält als einziges Kohlenhydrat Lactose
  - glutenfrei
- enthält als einziges Kohlenhydrat Lactose
  - glutenfrei
- zusätzlich enthält Bebivita 1 im Unterschied zu Bebivita Pre leicht verdauliche Stärke → sie ist angenehm sämig und gut sättigend
  - glutenfrei
- enthält alle wichtigen Nähr- und Aufbaustoffe (gemäß Diät-VO)
  - mit Eisen für die Blutbildung
  - mit Omega 3 Fettsäuren für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen
- kindgerecht reduzierter Eiweißgehalt
  - mit Calcium und Vitamin D für die Knochen
  - mit Omega 3 Fettsäuren für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen

## Bitte beachten Sie:

- Muttermilch ist das Beste für Ihr Baby. Wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Klinik oder Ihrem Kinderarzt.
- Wenn nicht gestillt wird, sollte generell in den ersten sechs Monaten Anfangsmilch gegeben werden. Folgemilch ist grundsätzlich nach dem 6. Monat als Teil einer gemischten Beikosternährung vorgesehen und nicht als Muttermilchersatz in den ersten sechs Lebensmonaten. Sie kann aber mit der Umstellung auf Beikosternahrung (frühestens nach dem 4. Monat möglich) schon vorher gefüttert werden. Sprechen Sie dann aber mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme.